

Oireet



Nivelpsoriasis aiheuttaa hyvin moninaisia ja vaihtelevia oireita. Tulehdus ilmenee yleisimmin muutamassa nivelessä, mutta tauti voi aiheuttaa oireita nivelten lisäksi jänteissä, janteiden kiinnityskohdissa tai selkärangassa.^{1,2}

Oireita voivat olla:^{1,2}

- Nivelten arkuus, kipu ja jäykkyys
- Muutaman nivelen tulehdukset (turvotus, kuumotus)
- Yhden tai useamman sormen tai varpaan turpoaminen "makkaramaiseksi" (daktyliitti)
- Jänteen tai janteen kiinnityskohdan tulehdukset kuten ns. tenniskyynärpää (entesiitti)
- Pitkittynyt tulehduksellisen tyypin selkäkipu (yökipu, aamujäykkyys, liikkuaessa helpottuva kipu)
- Kynsimuutokset
- Väsymys ja heikentynyt fyysinen suoritus- ja toimintakyky

Oireet voivat muistuttaa nivelreumaa, mutta nivelpsoriasisissa tulehdukset saattavat esiintyä epäsymmetrisesti ja laboratoriotesteissä mitatut reumatekijät tai tulehdusmerkkiaineet voivat olla normaalit.^{1,2}

Lähteet:

1. Nivelpsoriasis opas. Tietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Reumaliitto & Psoriasisliitto. Ladattu 13.03.2023.

2. <https://www.terveyskyla.fi/reumatalo/reumasairaudet/selk%C3%A4rankareum...> (Viitattu 13.03.2023)

FI2403125511

Source URL: <https://www.novartis.com/fi-fi/potilaille-ja-omaisille/tietoa-terveydesta/nivelpsoriasis/oireet>

List of links present in page

- <https://www.novartis.com/fi-fi/potilaille-ja-omaisille/tietoa-terveydesta/nivelpsoriasis/oireet>
- <https://www.terveyskyla.fi/reumatalo/reumasairaudet/selk%C3%A4rankareumat/nivelpsoriaasi>