

Aksiaalisen spondylartriitin eri muodot

Aksiaalinen spondylartriitti voidaan jakaa klassiseen selkärankareumaan ja ei-radiografiseen aksiaaliseen spondylartriittiin.¹

Aksiaalinen spondylartriitti etenee hitaasti vuosien aikana. Selkärangan alaosassa olevan ristiluun ja lantion luiden väliseen liitokseen kehittyy vuosien varrella tulehdusmuutoksia ja luutumaa. Jos muutokset on havaittavissa röntgenkuvauksessa, kyseessä on selkärankareuma. Varhaisemmassa vaiheessa, kun tulehdusmuutokset ovat havaittavissa ainoastaan magneettikuvauksessa, kyseessä on ei-radiografinen spondylartriitti. Noin kolmannes ei-radiografisista spondylartriiteista etenee selkärankareumaksi.¹

Alatyypien katsotaan olevan saman sairauden jatkumoa, mutta sairaus ei välttämättä etene selkärankareumaksi kaikilla ei-radiografista spondylartriittia sairastavilla.¹

Lue lisää aksiaalisen spondylartriitin [oireista](#)

Lähteet :

1. Duodecim Terveysportti; Lääkärin käsikirja: Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti

FI2303241965

Source URL: <https://www.novartis.com/fi-fi/potilaille-ja-omaisille/tietoa-terveydesta/aksiaalinen-spondylartriitti/aksiaalisen-spondylartriitin-eri-muodot>

List of links present in page

- <https://www.novartis.com/fi-fi/potilaille-ja-omaisille/tietoa-terveydesta/aksiaalinen-spondylartriitti/aksiaalisen-spondylartriitin-eri-muodot>
- <https://www.novartis.com/fi-fi/potilaille-ja-omaisille/tietoa-terveydesta/aksiaalinen-spondylartriitti/oireet-ja-diagnoosi>